

15 SSK TIP KONGRESİ



**ALTINYUNUS
ÇEŞME / İZMİR**

18 - 21 NİSAN 1994

SSK 15. TIP KONGRESİ

BAŞLIK : AKUT KOLESİSTİTLERDE LAPAROSKOPİK KOLESİSTEKTOMİ
ARAŞTIRMACILAR : Dr. Tezcan TOGULGA, Dr. Ali SAPMAZ, Dr. Bahattin CANBEYLİ, Dr. Yahya ÇAPKİS, Dr. Metin YEŞİLTAŞ, Dr. Muharrem KARAOĞLAN, Dr. Bekir ÖZENEN

1. SSK Tepecik Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği

ÖZET : 1991 Ekim ile 1993 Ekim arasında 39 akut kolesistitli hasta laparoskopik kolesistektomiye alındı. Grubumuzdaki hastalar şikayetlerinin başlangıcından itibaren 48-72 saat arasında operasyona alınan laparoskopik anatomik görünüm ile akut kolesistitle uyumlu olan histopatolojik akut kolesistit tanısı alan vakalardır. Değişik oranlarda çeşitli klinik -labaratuvar bulgular mevcuttu. 32 kadın 7 erkek hasta olup 3'ü daha önceden alt batın, 1'i üst batın ameliyatı geçirmişti. 3 hastada ilaçla regüle diabet, 1 hastada ilaçla regüle hipertansiyon mevcuttu. Tüm hastalara profilaktik olarak (Preop ve postop birer doz) 2 doz üçüncü kuşak sefalosporin uygulandı. Operasyonlar 3 tane 10 mm'lik trokarla yapıldı. Anestezi başladıktan sonra hastalara nazogastrik sonda takılıp postop 2. saate çıkarıldı. Ortalama ameliyat süresi 62 dakikadır. 5 hastada (%12.8) açık yöneme dönüldü. Major ameliyat komplikasyonumuz yoktur. Mortalitemiz yoktur. 2 hastada sistik kanal yaralanması, 2 hastada 1 ve 3 gün süren safra sızıntısı, 3 hastada trokar yeri enfeksiyonu gelişti. Başlangıçta laparoskopik kolesistektomiye rölatif olarak kontrendike sayılan akut kolestitli vakalar deneyimin artması ile endikasyon sahasına girmiştir. Ameliyat süresinin daha uzun olması ve açık yöntemle daha yüksek dönüşüm oranına rağmen hastanın hastanede kalma süresinin azlığı, postoperatif devredeki rahatsızlığın çok az olması, aktiviteye dönüş süresinin kısalığı ve kozmetik avantajları nedeni ile laparoskopide deneyimli cerrahlarca akut kolesistitli hastalarda laparoskopik cerrahi güvenle uygulanabilir kanısındayız.