

19. ULUSAL CERRAHI KONGRESİ

14. CERRAHI
HEMŞİRELİĞİ
KONGRESİ



**TÜRK
CERRAHI
DERNEĞİ**

www.uck2014.org

KONGRE BİLDİRİLERİ

SS-342[Endoskopi]

ADENOMATÖZ KOLON POLİPLERİNDE İLERİ YAŞ POPÜLASYONDA HANGİ ENDOSKOPİK İNCELEME FAYDALI OLUR?

Sedat Kamalı¹, Metin Yeşiltaş¹, Seracettin Eğin¹, Gülçin Kamalı², Ali Alemdar¹, Emre Sivrikoz¹, Birol Ağca³

¹SB Okmeydanı EA Hastanesi Genel Cerrahi

²SB Okmeydanı EA Hastanesi Patoloji Bölümü

³SB Fatih Sultan Mehmet EA Hastanesi Genel Cerrahi

Potensiyel kolorektal karsinom gelişme riskinden dolayı kolon polipleri önemli lezyonlardandır. Poliplerin kolondaki dağılımı kanser için uygulanacak tarama yöntemlerinin belirlenmesinde önemli olabilir.

SB Okmeydanı EA hastanesinde yapılan kolonoskopik 1356 polipektomi incelendi. 286 hipertrofik, 82 enflamatuvar, 3 serrated, 3 juvenil ve 982 adenomatöz polip görüldü. adenomatöz polipler demografik, anatomik dağılım, histopatolojik özellikleri açısından değerlendirildi.

565 erkek 417 kadın hastada 982 adenomatöz polip incelendi. 693 polip tubuler (%70), 245 polip tubulo villöz (%25), 44 tanesinde villöz(%5) idi.81 polipte (%8,2) karsinom gelişimi izlendi. 226 polip ağır displazi (%23) gösterirken 675 polipde hafif displazi saptandı. Tubuler poliplerin %4,9 unda karsinom görülürken, tubulovillöz poliplerde %16, villöz poliplerde ise bu oran%21di. Ağır displazi villöz poliplerde %61, tubulovillöz poliplerde %41, tubuler poliplerde ise %15 di. Rektum 340, sigmoid kolon 328 ve inen kolon 108 polipektomi ile en sık izlenen bölgelerdi. Çekumdan splenik fleksuraya kadar 197 (%20 sağ kolon) polipektomi, 785 tanede (%80) sol kolon polipektomisi yapılmıştı. Sağ taraf hastalarının yaş ortalaması 65,9yıl, sol kolon için ise 62,1yıl dı. (p<0,05).

Hücre tipi ve lokalizasyon arasında (p:0,043) ve hücre tipi ile displazi arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantı (p<0,0001) bulundu(pearson). Çalışmamızda sol kolonda (splenik fleksura distali) poliplerin daha fazla sayıda ve displazi şiddetinin artmış olduğunu gördük. Hastanemizde alt GIS endoskopisi olarak büyük çoğunlukla kolonoskopi kullanılmaktadır. Özellikle ileri yaş hastalarda gerektiğinde polipektomi ile birlikte uygulanabilecek endoskopik inceleme kolon kanserinin erken tanı ve tedavisindeki yeri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: adenomatöz kolon polipleri, polipektomi, kolonoskopi

19. ULUSAL CERRAHI KONGRESİ

16 - 20 NISAN 2014 / ANTALYA

RIXOS SUNGATE VEGA KONGRE MERKEZİ



TÜRK
CERRAHİ
DERNEĞİ

METİN YEŞİLTAŞ

16-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi'nde düzenlenen **19. Ulusal Cerrahi Kongresi**'ne katılmıştır.

Yeşim Erbil
TCD Başkanı

Mehmet Faik Özçelik
Kongre Başkanı

Kaya Sarıbeyoğlu
Kongre Sekreteri

Bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından 35 "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" kredi puanı ile kredilendirilmiştir.